

**Amtliche Abkürzung:** Natura 2000-LVO M-V  
**Fassung vom:** 09.08.2016  
**Gültig ab:** 20.08.2016  
**Dokumenttyp:** Verordnung  
**Quelle:**



**Gliederungs-Nr:** 791-9-4

Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern  
(Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V)<sup>1</sup>  
Vom 12. Juli 2011

### **DE 2350-401 Ueckermünder Heide**

#### **Maßgebliche Gebietsbestandteile**

| Vogelart           |                            | Lebensraumelemente [siehe Vorbemerkung]                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| dt. Name           | wiss. Name                 | Brutvogel                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zug-, Rastvogel, Überwinterer |
| <b>Bekassine</b>   | <i>Gallinago gallinago</i> | im Wesentlichen waldfreie feuchte bis nasse Flächen (z. B. Feucht- und Nassgrünland, Moore und Sümpfe) mit möglichst langanhaltender Überstauung und Deckung gebender Vegetation, wobei ein niedriger sehr lichter Baumbestand toleriert wird                                  | -                             |
| <b>Blauehlchen</b> | <i>Luscinia svecica</i>    | - von Wasser und horstartig verteilten Gebüschern durchsetzte Röhrichte und Verlandungszonen<br><br>- von Grauweidengebüschern durchsetzte Torfstiche                                                                                                                          |                               |
| <b>Brachpieper</b> | <i>Anthus campestris</i>   | offene und spärlich bewachsene Flächen (v. a. Pionier- Sandfluren, Sandmagerrasen, trockene Zwergstrauchheiden) auf trockenen, wasserdurchlässigen Böden                                                                                                                       |                               |
| <b>Eisvogel</b>    | <i>Alcedo atthis</i>       | - störungsarme Bodenabbruchkanten von steilen Uferwänden an Flüssen und Seen, ersatzweise auch Erdabbaustellen und Wurzelteller geworfener Bäume in Gewässernähe (Nisthabitat)<br><br>sowie<br><br>- ufernahe Bereiche fischreicher Stand- und Fließgewässer mit ausreichender |                               |

|                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                            | Sichttiefe und uferbegleitenden Gehölzen (Nahrungshabitat mit Ansitzwarten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fischadler</b>        | <i>Pandion haliaetus</i>   | <p>möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf Windkraftanlagen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit fischreichen Gewässern mit ausreichender Sichttiefe</li> </ul> <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit herausragenden Altbäumen in Wäldern oder Altbäumen an Waldrändern sowie anderen exponierten Horstunterlagen (z. B. Stromleitungsmasten) und Störungsarmut in der Brutperiode (Nisthabitat)</li> </ul> | fischreiche Gewässer mit ausreichender Sichttiefe                                                                                                                                                                |
| <b>Goldregenpfeifer</b>  | <i>Pluvialis aprinaria</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- große, offene, unzerschnittene und störungsarme Landwirtschaftsflächen ohne oder mit niedriger Vegetation</li> <li>- große Schlickflächen (auch Schlafplatz)</li> </ul> |
| <b>Großer Brachvogel</b> | <i>Numenius arquata</i>    | ausgedehnte, unzerschnittene und störungsarme, frische bis feuchte, in Teilbereichen auch nasse angepasst bewirtschaftete Grünlandflächen (vorzugsweise mit unterschiedlichen Feuchtigkeitsgradienten) mit geringem Druck durch Bodenprädatoren                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |

|                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Heidelerche</b> | <i>Lullula arbo-<br/>rea</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- lichte Kiefernwälder auf Sandstand-<br/>orten</li> <li>- trockene Randbereiche und Lichtun-<br/>gen (einschließlich Schneisen und Kahl-<br/>schlägen) von Kiefernwäldern mit lü-<br/>ckiger und überwiegend niedriger Ve-<br/>getation (insbesondere Zwergstrauch-<br/>heiden und Sandmagerrasen, aber<br/>auch trockene Gras- oder Stauden-<br/>fluren oder ähnliche Flächen, Wegrän-<br/>der und Säume im Übergang zwischen<br/>Wald und Offenland)</li> </ul> |  |
| <b>Kranich</b>     | <i>Grus grus</i>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- störungsarme nasse Waldbereiche,<br/>wasserführende Sölle und Senken,<br/>Moore, Sümpfe, Verlandungszonen von<br/>Gewässern und renaturierte Polder</li> <li>- angrenzende oder nahe störungsar-<br/>me landwirtschaftlich genutzte Flächen<br/>(insbesondere Grünland)</li> </ul>                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Neuntöter</b>   | <i>Lanius collu-<br/>rio</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- strukturreiche Hecken, Waldmän-<br/>tel, Strauchgruppen oder dornige<br/>Einzelsträucher mit angrenzenden als<br/>Nahrungshabitat dienenden Grünland-<br/>flächen, Gras- oder Staudenfluren oder<br/>ähnlichen Flächen (ersatzweise Säume)</li> <li>- Heide- und Sukzessionsflächen mit<br/>Einzelgehölzen oder halboffenem Cha-<br/>rakter</li> <li>- Strukturreiche Verlandungsbereiche<br/>von Gewässern mit Gebüsch und<br/>halboffene Moore</li> </ul>      |  |

|                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Rohrdommel</b> | <i>Botaurus stellaris</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- breite, störungsarme und weitgehend ungenutzte Verlandungszonen mit Deckung bietender Vegetation (insbesondere Alt-Schilf- und/oder typhabestimmte Röhrichte),</li> <li>- in Verbindung mit störungsarmen nahrungsreichen Flachwasserbereichen an der Boddenküste, an Seen, Torfstichen, Fischteichen, Flüssen, offenen Wassergräben oder in renaturierten Poldern</li> </ul>                                                                                                                                             |  |
| <b>Rohrweihe</b>  | <i>Circus aeruginosus</i> | <p>möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit störungsarmen, weitgehend ungenutzten Röhrichten mit möglichst hohem Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten und geringem Druck durch Bodenprädatoren (auch an Kleingewässern)</li> </ul> <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit ausgedehnten Verlandungszonen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen (insbesondere Grünland) als Nahrungshabitat</li> </ul> |  |
| <b>Rotmilan</b>   | <i>Milvus milvus</i>      | <p>möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen und</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     |                        | <p>Altbäumen insbesondere im Waldrandbereich sowie einem störungsarmen Horstumfeld, ersatzweise auch Feldgehölze und Baumreihen (Bruthabitat)</p> <p>und</p> <p>- mit hohen Grünlandanteilen sowie möglichst hoher Strukturdichte (Nahrungshabitat)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Schreiadler</b>  | <i>Aquila pomarina</i> | <p>möglichst großflächige unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen)</p> <p>- mit störungsarmen Waldgebieten (Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder) und darin eingeschlossenen Schreiadlerschutzarealen mit ausgedehnten Altbeständen, die einen ausreichend hohen Schlussgrad aufweisen (Bruthabitat)</p> <p>und</p> <p>- mit hohen Grünlandanteilen (vorzugsweise störungsarm und nahe des Brutwaldes, ersatzweise auch grünlandähnliche Flächen und niedrigwüchsige Dauerkulturen) sowie einer hohen Dichte an linienhaften Gehölzstrukturen und Feuchtlebensräumen</p> |  |
| <b>Schwarzmilan</b> | <i>Milvus migrans</i>  | <p>möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen und Altbäumen insbesondere im Waldrandbereich sowie einem störungsarmen Horstumfeld, ersatzweise auch Feldgehölze und Baumreihen (Bruthabitat)</li> </ul> <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit hohen Grünlandanteilen und/oder fischreichen Gewässern als Nahrungshabitat</li> </ul>                                                                                                                  |  |
| <b>Schwarzspecht</b> | <i>Dryocopus martius</i> | größere, vorzugsweise zusammenhängende Laub-, Nadel- und Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen und Totholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Schwarzstorch</b> | <i>Ciconia nigra</i>     | <p>möglichst großflächige unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit störungsarmen Waldgebieten (insbesondere Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder) mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen als Bruthabitat</li> </ul> <p>sowie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit fischreichen naturnahen Bachläufen und Grünlandbereichen mit Kleingewässern und Senken als Nahrungshabitat</li> </ul> |  |

|                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Seeadler</b>         | <i>Haliaeetus albicilla</i> | <p>möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen)</p> <p>- mit störungsarmen Wäldern (vorzugsweise Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze) mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen als Bruthabitat</p> <p>sowie</p> <p>- fisch- und wasservogelreiche Seen als Nahrungshabitat</p> |  |
| <b>Sperbergrasmücke</b> | <i>Sylvia nisoria</i>       | Hecken, Gebüsche und Waldränder mit einer bodennahen Schicht aus dichten, dornigen Sträuchern und angrenzenden offenen Flächen (vorzugsweise Feucht- und Nassgrünland, Trockenrasen, Hochstaudenfluren, Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen)                                                                                                                                |  |
| <b>Tüpfelsumpfhuhn</b>  | <i>Porzana porzana</i>      | störungsarme Verlandungsbereiche von Gewässern, lockere Schilfröhrichte mit kleinen Wasserflächen, Torfstiche, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, renaturierte Polder                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Wachtelkönig</b>     | <i>Crex crex</i>            | Grünland (vorzugsweise Feucht- und Nassgrünland) mit Deckung gebender Vegetation, flächige Hochstaudenfluren, Seggenriede sowie Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen                                                                                                                                                                                                         |  |

|                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Weißstorch</b>   | <i>Ciconia ciconia</i>       | <p>möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (im Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen)</p> <p>- mit hohen Anteilen an (vorzugsweise frischen bis nassen) Grünlandflächen sowie Kleingewässern und feuchten Senken (Nahrungshabitat),</p> <p>sowie</p> <p>- Gebäude und Vertikalstrukturen in Siedlungsbereichen (Horststandort)</p> |  |
| <b>Wiedehopf</b>    | <i>Upupa epops</i>           | <p>großflächige, trockene Heiden mit angrenzenden Waldrändern und lichten Gehölzbeständen, in denen Großhöhlen vorkommen (ersatzweise sonstige Höhlen aller Art)</p>                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Ziegenmelker</b> | <i>Caprimulgus europaeus</i> | <p>- lichte Kiefernwälder auf Sandstandorten</p> <p>- mit Einzelgehölzen bestandene Randbereiche großflächiger Heiden</p> <p>- größere Lichtungen (z. B. Schneisen) von Kiefernwäldern mit lückiger und überwiegend niedriger Vegetation (insbesondere Zwergstrauchheiden und Sandmagerrasen)</p>                                                           |  |

## **Fußnoten**

- 1) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/17/EU (ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 193) geändert worden ist, sowie der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7), die durch die Richtlinie 2013/17/EU (ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 193) geändert worden ist.

## **Redaktionelle Hinweise**

Fundstelle: GVOBl. M-V 2011, 462